

## ◆ 薬価基準未記載医薬品 (10月発売開始)

製造販売承認日	発売日	商品名	会社名	成分名	4.効能・効果	6.用法・用量等	7.用法及び用量に関する注意	8. 重要な基本的注意 (抜粋)	作用機序等	RMP(10/4現在)
2023/3/27	10/4	フルミスト点鼻液	製造販売元／ 第一三共	弱毒生インフルエンザウイルス (A型・B型)	インフルエンザの予防	2歳以上19歳未満の者に、0.2mLを1回 (各鼻腔内に0.1mLを1噴霧)、鼻腔内に噴霧する。	7.1 同時接種 医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することができる。	8.5 本剤は弱毒生インフルエンザワクチンであり、飛沫又は接触によりワクチンウイルスの水平伝播の可能性があるため、ワクチン接種後1～2週間は、重度の免疫不全者との密接な関係を可能な限り避けるなど、必要な措置を講じることを被接種者又はその保護者に説明すること。	季節性インフルエンザは、インフルエンザA型 (H1N1亜型及びH3N2亜型) 及びインフルエンザB型 (Yamagata系統及びVictoria系統) ウイルスを原因ウイルスとする呼吸器感染症である。季節性インフルエンザウイルスの主な侵入経路は気道の粘膜表面であり、ウイルスは気道上皮細胞に感染した後に増殖し、感染から1～2日後に発症する。このワクチンの接種は、抗原特異的血清中抗体及び粘膜抗体応答、並びに抗原特異的T細胞応答を誘導し、インフルエンザの予防に寄与すると考えられる。	<a href="#">RMP</a>